

# LA CORRETTA ROUTINE DI MUNGITURA

Una corretta routine di mungitura assicura  
un basso livello di contaminazione batterica del latte  
ed aiuta a ridurre il rischio di infezione mammaria





**1**

Utilizzare sempre i **guanti** durante la mungitura



#### OBIETTIVO

ridurre il rischio di trasmissione delle infezioni da una bovina all'altra (e dalla bovina all'uomo) attraverso le mani del mungitore.

#### AZIONE

indossare guanti a perdere in gomma, lattice o polipropilene.

#### SUGGERIMENTI

risciacquare frequentemente i guanti durante la mungitura in una soluzione disinfettante.  
Cambiare i guanti se lacerati.

**2**

Eliminare e controllare i primi getti di latte



#### OBIETTIVO

rimuovere i batteri penetrati nel canale del capezzolo dall'ultima mungitura e la parte di latte più ricca in cellule somatiche; evidenziare coaguli o "stoppini", indicativi della presenza di infezioni del quarto; stimolare, attraverso il massaggio del capezzolo, la scarica di Ossitocina ed il "riflesso di eiezione" del latte.

#### AZIONE

"stripping" manuale dei primi 3-4 getti di latte da ciascun capezzolo.

#### SUGGERIMENTI

la palpazione della mammella facilita una precoce rilevazione dei casi clinici.

3



Eeguire il **pre-dipping**  
per la pulizia dei capezzoli



#### OBIETTIVO

misura di controllo delle mastiti da ambientali e di contenimento della carica batterica nel latte di massa.

#### AZIONE

disinfezione del capezzolo pre-mungitura con prodotto idoneo.

#### SUGGERIMENTI

far agire il disinfettante sui capezzoli per un tempo minimo di 20-30 secondi. In alternativa al pre-dipping, se i capezzoli sono già abbastanza puliti, utilizzare una salviettina monouso per la pulizia a secco.

4



**Asciugare** accuratamente i  
capezzoli



#### OBIETTIVO

asportare completamente il disinfettante dal capezzolo per far sì che i capezzoli siano puliti e asciutti prima dell'attacco del gruppo di mungitura ed evitare il rischio di contaminazione chimica del latte.

#### AZIONE

utilizzare tovagliette di carta monouso oppure stracci individuali (da lavare a 90° in lavatrice e da far asciugare tra una mungitura e l'altra).

#### SUGGERIMENTI

*ricorda:* 1 straccio - 1 bovina.  
Mai utilizzare lo stesso straccio o la stessa tovaglietta per più bovine.

5



Attaccare **correttamente e tempestivamente** il gruppo di mungitura



#### OBIETTIVO

ottimizzare la durata della mungitura in relazione al tempo di latenza della scarica di Ossitocina.

#### AZIONE

attaccare il gruppo al massimo entro 1,30 min. dall'inizio della preparazione del capezzolo.

#### SUGGERIMENTI

al momento dell'attacco della guaina al capezzolo piegare ad angolo retto il tubo corto del latte, in modo da "strozzare" il tubo ed evitare il risucchio di aria all'interno della guaina.

6



Controllare il **corretto allineamento** del gruppo durante la mungitura



#### OBIETTIVO

i gruppi devono adattarsi comodamente ai capezzoli, senza torsioni e irritazioni, per assicurare una regolare estrazione del latte ed evitare l'ingresso eccessivo di aria nel sistema, con fluttuazioni del vuoto.

#### AZIONE

durante la mungitura controllare l'allineamento del gruppo e correggerlo se necessario, per prevenire scivolamenti delle guaine.

#### SUGGERIMENTI

Al termine della mungitura rimuovere tempestivamente il gruppo per prevenire la sovramungitura e possibili danni alla punta del capezzolo. Non rimuovere il gruppo mentre è ancora sotto vuoto, poiché questo può provocare forze di "impatto" e danneggiare lo sfintere del capezzolo.

7



Disinfettare il capezzolo  
(**post-dipping**)



#### OBIETTIVO

eliminare i batteri presenti sulla cute del capezzolo prima che possano penetrare all'interno; migliorare le condizioni della cute del capezzolo (specie se il prodotto contiene emollienti).

#### AZIONE

al termine della mungitura immergere completamente la superficie del capezzolo in una soluzione disinfettante.

#### SUGGERIMENTI

il metodo migliore è per immersione del capezzolo nel "bicchierino" con il disinfettante. Il bicchierino deve essere pulito frequentemente. Se il disinfettante è colorato e meglio, poiché rende più facilmente visibile l'efficienza di copertura dei capezzoli.

8



Far **sostare in piedi** le bovine  
al termine della mungitura



#### OBIETTIVO

consentire allo sfintere del capezzolo ancora pervio di chiudersi completamente prima che venga a contatto con i batteri presenti nella lettiera.

#### AZIONE

all'uscita della sala di mungitura far **sostare in piedi** le bovine per almeno 20-30 minuti.

#### SUGGERIMENTI

è utile fornire alimento fresco ed acqua in abbondanza immediatamente dopo la mungitura.






Intervet Italia S.r.l  
Via Walter Tobagi, 7  
20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Italia  
Tel: +39 02 51686.1  
Fax: +39 02 51686.685  
[www.intervet.it](http://www.intervet.it)



RESEARCH • PERFORMANCE • INTEGRITY

## LA CORRETTA ROUTINE DI MUNGITURA



Intervet Italia S.r.l  
Via Walter Tobagi, 7  
20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Italia  
Tel: +39 02 51686.1  
Fax: +39 02 51686.685  
[www.intervet.it](http://www.intervet.it)

intervet

RESEARCH • PERFORMANCE • INTEGRITY