

**panadron** <sup>P L U S</sup>

Compresse per cani

**1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI, SE DIVERSI**

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,  
Loughrea,  
Co. Galway,  
Irlanda.

Distributore:

MSD Animal Health S.r.l.  
Strada di Olgia Vecchia snc, Centro Direzionale Milano Due,  
Palazzo Canova, 20054 Segrate (MI)

**2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

Panadron Plus compresse per cani.  
Praziquantel, Pirantel, Febantel.

**3. INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

Una compressa appetibile al gusto di carne di maiale contiene 50 mg di praziquantel, 50 mg di pirantel (equivalente a 144 mg di pirantel embonato) e 150 mg di febantel.

**4. INDICAZIONE(I)**

Nei cani: trattamento di infestazioni miste sostenute da nematodi e cestodi delle seguenti specie:

**Nematodi:**

**Ascaridi:** *Toxocara canis* e *Toxascaris leonina* (forme adulte e immature).

**Ancilostomi:** *Uncinaria stenocephala* e *Ancylostoma caninum* (adulti).

**Tricocefali:** *Trichuris vulpis* (adulti).

**Cestodi:**

**Tenie:** *Echinococcus* spp. (*E. granulosus*, *E. multilocularis*), *Taenia* spp. (*T. hydatigena*, *T. pisiformis*, *T. taeniformis*) e *Dipylidium caninum* (forme adulte e immature).

**5. CONTROINDICAZIONI**

Non somministrare contemporaneamente composti della piperazina poiché gli effetti antelmintici del pirantel e della piperazina possono essere antagonizzati.

Non usare in caso di ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

**6. REAZIONI AVVERSE**

Nessuna nota.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

**7. SPECIE DI DESTINAZIONE**

Cani.

**8. POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Per singola somministrazione orale.

Per i dosaggi attenersi alle seguenti indicazioni: 15 mg/kg di peso corporeo per il febantel, 5 mg/kg per il pirantel (equivalente a 14,4 mg di pirantel embonato) e 5 mg/kg per il praziquantel.

1 compressa per 10 kg di peso corporeo. Le compresse possono essere somministrate direttamente al cane o nascoste nel cibo.

Né prima né dopo il trattamento è necessario un periodo di digiuno.

**Guida al dosaggio:**

Peso corporeo (kg)	Compresse
½ - 2,5	1/4
2,6 - 5,0	½
5,1 - 10,0	1
10,1 - 15,0	1½
15,1 - 20,0	2
20,1 - 25,0	2½
25,1 - 30,0	3
30,1 - 35,0	3½
35,1 - 40,0	4
>40,1	1 compressa per 10 kg

Se c'è un rischio di reinfezione, rivolgersi ad un veterinario per richiedere indicazioni sulla necessità e frequenza di altre somministrazioni.

**9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Per assicurare il dosaggio corretto, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile. Eliminare le frazioni di compressa inutilizzate.

**10. TEMPO(I) DI ATTESA**

Non pertinente.

**11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Non somministrare dopo la data di scadenza indicata in etichetta. Questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale condizione di conservazione.

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

**12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)**

Non somministrare contemporaneamente ai composti della piperazina poiché gli effetti antelmintici del pirantel e della piperazina possono essere antagonizzati.

L'infestazione da tenie si ripresenterà sicuramente se non si attuano misure di controllo sugli ospiti intermedi, come le pulci, i topi, ecc. L'infestazione da tenie è improbabile nei cuccioli con età inferiore a 6 settimane. Non usare in caso d'ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Sono stati riferiti effetti teratogeni attribuiti ad elevate dosi di febantel nella pecora e nel topo.

Non sono stati eseguiti studi nelle cagne durante la prima parte della gravidanza. L'impiego del prodotto durante la gravidanza deve essere subordinato ad una valutazione del rapporto di rischio/beneficio da parte del veterinario responsabile.

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto nelle cagne durante le prime 4 settimane di gravidanza. Non superare la dose consigliata quando si trattano le cagne gravide.

**Avvertenze per l'utilizzatore:**

In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo.

Nel rispetto delle norme igieniche, lavarsi le mani dopo avere somministrato le compresse direttamente al cane o averle aggiunte al suo cibo.

Solo per uso veterinario.

**13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali.

Chiedere al proprio veterinario come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno.

Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

**14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO  
ILLUSTRATIVO**

03/2021

**15. ALTRE INFORMAZIONI**

Confezioni:

Scatola da 2 compresse    A.I.C. 104677012  
Scatola da 4 compresse    A.I.C. 104677024  
Scatola da 6 compresse    A.I.C. 104677048

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

LB14312